

# Actiflow Ca 560



**Calcio ad elevata concentrazione e microelementi per prevenire gli squilibri fisiologici delle colture.**

## COMPOSIZIONE

Ossido di calcio (CaO) totale P/P 32% - P/V 560 g/L

Zinco (Zn) totale P/P: 1,50% - P/V: 26 g/L

Manganese (Mn) totale P/P: 0,50% -P/V: 8 g/L

## DEFINIZIONE

Concime CE

## FORMA

Liquida

## FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

## CONFEZIONE

Taniche 2X5 L in palette da 680 L e 200L in palette da 800L



Taniche  
2x5 L



Tanica da  
200 L

Actiflow Ca 560 è un concime di sola origine naturale con sale di manganese (carbonato) e ossido di zinco; studiato specificatamente per prevenire eventuali squilibri fisiologici e nutrizionali in colture frutticole e orticole. Actiflow Ca 560 promuove il calibro di frutta e verdura, la loro conservazione e la resistenza ad urti. La scelta rigorosa delle materie prime, la loro qualità e il processo specifico di produzione garantiscono un prodotto ad alta efficienza. Actiflow Ca 560 garantisce una fornitura concentrata di nutrienti sufficiente a coprire le esigenze delle colture da 20 giorni a un mese con un singolo trattamento. Il prodotto non è aggressivo per le foglie e ha, a basso volume di acqua/ha, un'alta flessibilità di utilizzo. Associato ad agenti umettanti e adesivanti, riduce drasticamente la lisciviazione degli elementi nutritivi.

COLTURA	DOSE	CONCENTRAZIONE MAX	EPOCA	UTILIZZO
Pomacee	3-5 L/ha	3%	Ripetere le applicazioni ogni 7 - 10 giorni dalla caduta petali fino ad un mese prima della raccolta. Prevedere minimo 5 trattamenti.	Fogliare
Drupacee	3-5 L/ha	3%	Fino a 5 applicazioni a partire dall'imbrunimento dello stigma (Gf) ed ogni 10-15 giorni durante la fase di ingrossamento frutto. Sospendere il trattamento ad un mese prima della raccolta.	Fogliare
Agrumi	5 L/ha	3%	3 applicazioni prima della fioritura, subito dopo la fioritura e durante l'ingrossamento del frutto.	Fogliare
Vite da vino	3-5 L/ha	3%	Da 2 a 4 trattamenti. Da grano pepe ad invaiatura	Fogliare
Pomodoro da industria	3-5 L/ha	3%	Applicazioni ripetute a partire da ingrossamento bacca. Trattamenti distanziati di 15 giorni.	Fogliare
Tutte le colture	5-10 L/ha per ogni intervento.		Effetto ombreggiante Per prevenire le scottature.	Fogliare
Tutte le colture	5-10 L/ha per ogni intervento.			Terreno

