



Fixa Cuivre Plus

Il rame che aderisce meglio e protegge più a lungo.



Consentito in
agricoltura biologica

FIXA CUIVRE plus
Una soluzione efficace
per una protezione più
performante e una
miglior gestione
dei trattamenti

desangosse.it



Composizione

Anidride solforica (SO₃): 148 g/L
Rame (Cu): 120 g/L
Ossido di calcio (CaO): 84 g/L
Consentito in agricoltura biologica



Forma
Liquida



Packaging
Taniche 12X1 L - 10 L



pH
6



Densità
1,3 kg/l



Precision
technologies



La tecnologia FIXA

La sua formulazione a base di **lignosulfonati**, gli conferisce caratteristiche uniche, che permettono una **migliore adesività e distribuzione**



Vantaggi agronomici

FIXA CUIVRE plus grazie all'azione del **rame** legata a quella dello **zolfo** e **calcio**, migliora la qualità della coltura e le condizioni fitosanitarie della pianta.

I vantaggi in campo

- Proprietà naturali "complessanti" = capacità di formare complessi stabili e solubili con gli ioni metallici (Ferro - Cu- Mn-Zn)
- Maggior umidità della superficie della foglia su cui viene distribuito il prodotto;
- Maggiore igroscopicità della formulazione, che può agevolare la disponibilità dei nutrienti per la pianta.

FIXA CUIVRE plus garantisce un elevato **potere antibatterico** e una maggior **velocità della ripresa vegetativa**.



□ Dosi e consigli di utilizzo:

COLTURA	DOSE	CONCENTRAZIONE MASSIMA	CONCENTRAZIONE	UTILIZZO
Frutticole	1-4 L/ha	1 %	Dopo l'allegagione ed in post raccolta	Fogliare
Cereali a paglia	1-3 L/ha	1 %	1 o 2 applicazioni: dallo stadio di 2-3 foglie vere ad accestimento	Fogliare
Olivo	2-4 L/ha	1 %	2-4 applicazioni tra primavera e fine autunno	Fogliare
Orticole	2-4 L/ha	1 %	A partire dallo stadio di 4-6 foglie o allo stadio di 10 -15 cm della piantina	Fogliare
	2-4 L/ha	1 %		Terreno
IV gamma	200 - 300 ml/hl	1 %	In fase vegetativa	Fogliare
Vite da vino e uva da tavola	1-3 L/ha	1 %	Dopo l'allegagione	Fogliare
Agliacee	1-3 L/ha	1 %	Iniziare a trattare 2 settimane dopo il trapianto o per semina diretta quando la piantina è alta 15 cm, ripetere ogni 10 - 14 giorni se necessario	Fogliare
Pomodori da industria	2 - 3 L/ha	1 %	A partire dallo stadio di 4 - 6 foglie o allo stadio di 10 - 15 cm della piantina	Fogliare