

Fertigofol 426



Taniche
10 L



Tank
1000 L

Concime organico azotato- Borlanda fluida.

Borlanda fluida ottenuta da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali.

Riequilibra lo stato nutrizionale della pianta e favorisce la crescita fogliare e radicale durante tutto il ciclo culturale.

Attiva la fotosintesi e ha effetto rinverdente.

COMPOSIZIONE

Azoto organico (N) P/P 3%, Ossido di potassio (K₂O) P/P 5%, Carbonio organico (C) P/P 10%

DEFINIZIONE

Concime organico azotato- Borlanda fluida

MODALITÀ DI UTILIZZO

Fogliare

FORMA

Liquida

CONFEZIONE

Taniche 10 L in palette da 600 L - Tank 1000 L in palette da 1000 L

FertigoFol 426 è un concime organico azotato formulato con L- amminoacidi. Grazie al contenuto in azoto, potassio e carbonio organico, migliora lo stato nutrizionale della coltura; mentre gli L-amminoacidi influenzano positivamente la fioritura e l'allegagione, aiutano la pianta in condizioni di stress e regolano e sostengono la pianta nella produzione di zuccheri. FertigoFol 426 migliora la capacità fotosintetica, l'assorbimento e la traslocazione degli elementi minerali da parte del sistema radicale. Grazie alla sua speciale formulazione con acidi amminici, che rappresentano una fonte di carbonio direttamente disponibile per la pianta, FertigoFol 426 stimola la crescita e lo sviluppo in modo repentino.

COLTURA	DOSE	CONCENTRAZIONE MAX	EPOCA	UTILIZZO
Vite da vino e Uva da tavola	3-5 L/ha	5%	Ripetere il trattamento ogni 15 giorni dalla fase di grappolino visibile ad allegagione.	Fogliare
Pomacee e actinidia	3-5 L/ha	5%	4 applicazioni ogni 15 giorni a partire dalla fase di caduta petali	Fogliare
Agrumi	3-5 L/ha	5%	3 interventi da ripresa vegetativa ad ingrossamento frutti. E in condizioni di necessità per aumentare la maturazione tardiva dei frutti	Fogliare
Olivo	5-10 L/ha	5%	3 trattamenti dalla ripresa vegetativa ad ingrossamento drupa	Fogliare
Cereali a paglia	10-20 L/ha	5%	Inizio accestimento.	Fogliare
Riso	5-10L/ha	5%	Accestimento e botticella	Fogliare
Leguminose	5-10 L/ha	5%	3 trattamenti: a 5-10 cm di altezza della pianta, in fioritura e a formazione del baccello.	Fogliare
Orticole	5L/ha	5%	Dalla ripresa vegetativa 3-4 applicazioni ogni 15-20 giorni.	Fogliare
Patata	5L/ha	5%	3-4 applicazioni: dalla tuberificazione e poi ogni 15 giorni.	Fogliare
Soia, Colza, Barbabietola	15-40 L/ha	5%	All'emergenza ed in condizioni di sviluppo difficili.	Fogliare
Fragole/piccoli frutti	5-10 L/ha	5%	Prima e dopo l' allegagione	Fogliare

