

Fixa Cuivre Plus



Taniche
12x1 L



Taniche
10 L

Concime CE. Soluzione di concime a base di rame (Idrossido e solfato).

Ideale per prevenire e correggere le carenze di rame. Ha un bassissimo contenuto in metalli pesanti (nettamente al di sotto dei limiti FAO). Ha un elevato tasso di assorbimento fogliare grazie alla formulazione con lignosolfonati. Non aggressivo sui dispositivi tecnici

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale P/P 8,9%- P/V 120 g/L

DEFINIZIONE

Concime CE. Soluzione di concime a base di rame (Idrossido e solfato) (S 11)

MODALITÀ DI UTILIZZO

Fogliare

FORMA

Liquida

FORMULAZIONE

Lignosolfonati

CONFEZIONE

Taniche 12X1 L in palette da 720 L - Taniche 10 L in palette da 600 L

Fixa Cuivre Plus è un concime a base di rame (idrossido e solfato) e calcio (ossido di calcio) ideato per prevenire e correggere le carenze di questi due elementi nelle diverse colture. La sua speciale formulazione con lignosolfonati (agenti organici naturali estratti di legno), garantisce un elevato tasso di assorbimento fogliare. Essi infatti hanno ottime proprietà chelanti, adjuvanti e umettanti e garantiscono elevata adesività. Ciò assicura un'elevata efficacia dopo il trattamento.

Grazie alla sua elevata concentrazione (120 g/L Cu) e alla sua forma solfata; FIXA Cuivre Plus è estremamente efficace e veloce. La sua forma solubile viene assorbita e utilizzata facilmente dalle foglie.

COLTURA	DOSE	CONCENTRAZIONE MAX	EPOCA	UTILIZZO
Agliacee	1-2L/ha	1%	Iniziare a trattare 2 settimane dopo il trapianto o, per semina diretta, quando la piantina è alta 15 cm, ripetere ogni 10-14 giorni se necessario.	Fogliare
Agrumi	2-4 L/ha	1%	In post raccolta	Fogliare
Cereali a paglia	1-2 L/ha	1%	1 o 2 applicazioni: dallo stadio di 2-3 foglie vere fino ad accestimento.	Fogliare
Olivo	2-4 L/ha	1%	2-4 applicazioni tra primavera e fine autunno.	Fogliare
Orticole	1-2 L/ha	1%	A partire dallo stadio di 4-6 foglie o allo stadio di 10-15 cm della piantina.	Fogliare
IV gamma	200-300 ml/hl	1%	In fase vegetativa	Fogliare
Drupacee	1-4 L/ha	1%	Dopo l'allegagione e dopo la raccolta per favorire la caduta delle foglie	Fogliare
Pomacee	1-4 L/ha	1%	Dopo l'allegagione.	Fogliare
Vite da vino e uva da tavola	2L/ha	1%	Dopo l'allegagione	Fogliare

