

Turn On



Taniche
5 L

CONCIME CE: Miscela di microelementi manganese (Mn) (carbonato) e zinco (Zn) (ossido)

Migliora significativamente l'attività fotosintetica della pianta. Protegge le funzioni della pianta in condizioni di forti stress quali alte temperature e insufficiente disponibilità idrica. Aumenta il contenuto in sostanza secca anche in condizioni di forte stress abiotico.

COMPOSIZIONE

Manganese totale (Mn) 0,5%
Zinco totale (Zn) 1,5%

DEFINIZIONE

CONCIME CE: Miscela di microelementi manganese (Mn) (carbonato) e zinco (Zn) (ossido)

MODALITÀ DI UTILIZZO

Fogliare

FORMA

Liquida

CONFEZIONE

Taniche 3x5L

Turn On è un termoregolatore unico ed innovativo sviluppato dalla ricerca Agronutrition per massimizzare il processo fotosintetico anche in condizione di forte stress. Turn On è in grado di aumentare la fissazione del carbonio e di conseguenza la percentuale di sostanza secca nel frutto, favorendone resa e conservazione. Con l'applicazione di Turn On l'omogeneità del calibro dei frutti non viene compromessa dalla scarsa disponibilità di acqua e dalle alte temperature, garantendo in tal modo produzioni qualitativamente e quantitativamente elevate anche quando le condizioni atmosferiche non lo permetterebbero.

| COLTURA | DOSE | EPOCA | UTILIZZO |
|------------------------------|----------|---|----------|
| Vite da Vino e Uva da Tavola | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Agumi | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Orticole in pieno campo | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Orticole in serra | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Pomacee- Drupacee | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Actinidia | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Fragole e piccoli frutti | 2 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Olivo | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |
| Floricole/Ornamentali | 3-4 L/ha | Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto | Fogliare |