



Alcygol B2M BS

Il biostimolante a base di *Ascophyllum nodosum* per resistere a condizioni estreme e migliorare l'allegagione.



**Consentito in
agricoltura biologica**

**ALCYGOL B2M BS
migliora il
metabolismo delle
piante in condizioni di
stress abiotico**

desangosse.it



Composizione

Boro (B) solubile in acqua: 2,1 %,
Manganese (Mn) solubile in acqua: 0,8 %
Carbonio (C) organico di origine biologica: 0,7%
Magnesio (MgO) 3,8%
Mannitolo: 0,9 g/l
Sostanza secca: 33%



Forma

Liquida



Packaging

Taniche 12X1 L - 10 L



pH
7



Densità

1,2 kg/l

Gli effetti



Attiva i meccanismi naturali di difesa, supportando la pianta nelle condizioni ambientali difficili




Favorisce uno sviluppo vegetativo equilibrato, migliorando l'efficienza dei processi fisiologici



Aumenta l'efficacia dei trattamenti fogliari, migliorando l'assorbimento e la traslocazione dei nutrienti

I vantaggi in campo

- Stimola una buona induzione alla fioritura
- Promuove una fioritura uniforme
- Promuovere l'equilibrio nutrizionale dei frutti (calibro, maturità) mediante una miglior traslocazione dei nutrienti
- Aumenta la potenzialità produttiva delle colture
- Migliora la resistenza agli stress abiotici
- Previene l'insorgenza delle fisiopatie (butteratura amara, rugginosità ecc.)



Con tutti i benefici di **boro e manganese** su fiori e frutti.

☐ Dosi e consigli di utilizzo:

COLTURA	DOSE	EPOCA
Vite da vino e Uva da tavola	2-4 l/ha	3 applicazioni: grappoli separati, ingrossamento acini
Frutticole (Melo, Pero e Actinidia)	2-4 l/ha	3 applicazioni: boccioli fiorali visibili, inizio/piena fioritura e caduta petali/inizio allegagione
Fragola e Piccoli frutti	2-4 l/ha	In prefioritura per induzione a fiore; da inizio fioritura, ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni
Nocciolo	2-4 l/ha	Alla ripresa vegetativa, ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni
Orticole	2-4 l/ha	In prefioritura per induzione a fiore; da inizio fioritura, ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni
Drupacee	2-4 l/ha	3 applicazioni: boccioli fiorali visibili, inizio/piena fioritura e caduta petali/inizio allegagione
Agrumi	2-4 l/ha	3 applicazioni: ripresa vegetativa, prefioritura, ingrossamento frutticini
Olivo	2-4 l/ha	3 applicazioni: ripresa vegetativa, mignolatura, allegagione-ingrossamento frutti
Tutte le colture	2-4 l/ha	In condizioni di stress