DE SANGOSSE
Italia

L'attivatore della fotosintesi per contrastare lo stress termico

(prodotto a base di calcite micronizzata e silicio)

TURN ON

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 5,5% (90 g/L), Azoto (N) ureico 5,5% (90 g/L), Ossido di Calcio (CaO) totale 27% (445 g/L), Manganese (Mn) nella forma di carbonato totale 0,5%, Zinco (Zn) nella forma di carbonato totale 1,5%, Silicio (Si) 3,4%

FORMA
Liquida

PACKAGING
Taniche da 3x5 L
in palette da 720 L

TURN ON green

COMPOSIZIONE
Ossido di Calcio totale (CaO) 28% (440 g/L)
Silicio Totale (SiO2) 2% (31 g/L)
Amminoacido Prolina 0,6% (10 g/L)

FORMA
Liquida

PACKAGING
Taniche da 3x5 L
in palette da 720 L



desangosse.it

DE SANGOSSE
Italia

Modalità d'azione

Le particelle di calcite micronizzata ($CaCO_3$) passano attraverso gli stomi e una volta all'interno della cavità substomatica, si dissolvono in CO_2 e Calcio. Il **Silicio** invece garantisce un'assimilazione ottimale e il mantenimento della granulometria di ogni particella di calcite prevenendo fenomeni di agglomerazione sulla superficie fogliare.

Vantaggi Agronomici

- Aumentando la conduttanza stomatica e la fissazione del carbonio, la tecnologia **TURN ON** **migliora l'attività fotosintetica della pianta**;
- **Protegge** le funzioni produttive della pianta in situazioni di particolare **stress termico** (alta temperatura, vento e scarsa disponibilità d'acqua);
- **Aumenta** il contenuto in **sostanza secca** (effetto stoccaggio) ed il peso specifico allungando la shelf-life;
- Uniforma il calibro dei frutti e ne aumenta le dimensioni;
- Incrementa la produttività della pianta in termini qualitativi e quantitativi.

Consigli di utilizzo

Coltura	Dose	Epoca	Utilizzo
Vite da Vino e Uva da Tavola	2-3 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Agrumi	2-3L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Orticole in pieno campo	2-3 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Orticole in serra	2-3 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Pomacee - Drupacee	2-3 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Actinidia	2-3 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Fragole e piccoli frutti	2 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Olivo	2-3 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare
Floricole/Ornamentali	2-3 L/ha	Periodo di maggior picco termico: Luglio-Agosto	Fogliare

*Per altre informazioni si consiglia di contattare il vostro tecnico **DE SANGOSSE Italia** di zona.*

De Sangosse Italia S.r.l.
Strada Battaglia 129
35020 Albignasego (PD) – ITALIA

Tel. +39 049 6928 88
www.desangosse.it
info@desangosseitalia.it